

**ОПАСНО!****Преди употреба прочетете внимателно етикета**

За да се избегнат рисковете за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкцията за употреба!

**Внимание**

## Фендона® 60 СК Fendona® 60 SC

**Наименование и съдържание на активно вещество:** алфа-циперметрин 60 г/л**алфа-циперметрин** {1алфа(S), Залфа}-(алфа)-циано-(3-феноксифенил)метилов 3-(2,2-дихлороетенил) -2,2-дихлоровинил) - 2,2-диметилцикло пропанкарбоксилат. CAS № 67375-30-8**Вид на формулатията:** Суспензионен концентрат (СК)**Главна група 3 – контрол на вредителите.****Продуктов тип 18 – инсектициди, акарициди и продукти за контрол на други артроподи.****Разрешение за пускане на пазара** на биоциден препарат от Министерство на здравеопазването: 2583-2/08.05.2020 г.**Съдържание на опаковката:**.....**Условия за съхранение:** Фендона® 60 СК се съхранява в заключващи се сухи, хладни, проветряеми помещения, в добре затворени оригинални опаковки с етикети, отделно от хранителни продукти, напитки, цигари, фуражи. Да се пази от директно излагане на слънчевите лъчи. Да се съхранява далече от топлина, при температура над -10°C и не по-висока от 40°C.*При нормални условия продуктът не променя качествата си най-малко 3 години. По технически причини номерът на партидата и датата на производство са напечатани на друго място.***Указание за опасност:** H410 Много токсично за водните организми, с дълготраен ефект.**Указания за безопасност:** P273 Да се избягва изпускане в околната среда. P391 Да се събере разлятото. P501 Съдържанието / опаковките да се предадат на събирателен пункт за опасни или специални отпадъци. EUH208: Може да предизвика алергична реакция. Съдържа 1,2-БЕНЗИСОТИАЗОЛ-3(2Н)-ОН. Може да предизвика увреждания на чувствителността. АЛФА-ЦИПЕРМЕТРИН**Производител:** БАСФ АгроБ.В., Швейцария**Лице, което пуска продукта на пазара:**БАСФ ЕООД, София, бул.България 118,  
тел:02/9152069; факс:02/9152042;**Телефонен номер при специни случаи:**Клиника по токсикология към МБАЛСМ „ Н.И. Пирогов“  
+359 2 915-42-33;**International emergency number:** +49 180 2273-112.**Област на приложение:****Употреба 1:** За контрол на германски хлебарки (*Blattella germanica*, нимфи и възрастни), мравки (*Lasius niger*, възрастни), комари - (*Culex* spp, възрастни), оси (*Vespula* spp., възрастни), дървеници (*Cimex lectularius*, нимфи и възрастни) и домашни мухи (*Musca domestica*, възрастни) на закрито в големи търговски и индустриски сгради.**Употреба 2:** За контрол на германски хлебарки (*Blattella germanica*, възрастни, нимфи), мравки (*Lasius niger*, възрастни), комари (*Culex* spp., възрастни) и оси (*Vespula* spp spp., възрастни) в помещения за животни на закрито в птицеферми или люпилни в следните подкатегории:

- кокошки носачки, клетъчни батерии без третиране; носачки, клетъчни батерии без третиране;
- кокошки носачки, клетъчни батерии със система за изсушаване; носачки, клетъчни батерии със система за изсушаване;
- кокошки носачки, компактни клетъчни батерии; носачки, компактни клетъчни батерии;
- кокошки носачки, свободно отглеждани на решетъчен под;
- родители бройлери >18 свободно отглеждани на решетъчен под;



- родители бройлери за развъждане свободно отглеждани на решетъчен под;

#### **Начин на употреба:**

**Употреба №1** - Приложения, свързани с общественото здраве, в урбанизирани райони (големи търговски/обществени сгради) - професионална употреба (обучени професионалисти по реда на Наредба № 1 от 5 януари 2018г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации (обн. ДВ бр. 7 от 2018г.). Продуктът е течен концентрат, който се прилага чрез пръскане в цепнатини и пукнатини и/или точково за обработка на повърхности на закрито. Прилага се чрез обикновена ръчна или електрическа пръскачка, пригодена за пръскане под ниско налягане.

При немски хлебарки, мравки и дървеници, продуктът се прилага насочено в пукнатини и/или точково върху целеви зони или области, където насекомите могат да пълзят и да се скрият. За летящи насекоми продуктът се прилага насочено върху целеви зони или места, където насекомите пребивават.

**Употреба № 2** - Приложение в селското стопанство в помещения за животни – масова употреба и обучени професионалисти по реда на Наредба № 1 от 5 януари 2018г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации (обн. ДВ бр. 7 от 2018г.). Продуктът е течен концентрат, който се прилага като груб спрей (струя с едри капки) за обработка на повърхности на закрито. Специално внимание трябва да се обърне на пукнатини, цепнатини и на местата, които служат като местообитание и където насекомите преминават, кацат или укриват. Прилага се чрез обикновена ръчна или автоматична пръскачка, оборудвана за получаване на груб спрей при ниско налягане. При масовите потребители нанасянето е посредством протативна пръскачка или пулверизатор.

**Доза при Употреба № 1 и Употреба № 2:** 5 мл биоцид се разрежда в 1 литър вода (съотношение 1:200; 0,05 % v/v). Концентрация на активното вещество в работния разтвор 0,03 % (15 мг активно вещество/m<sup>2</sup>).

**При Употреба № 2** се разрешава и висока доза: 10 мл биоцид се разрежда в 1 л вода (съотношение 1:100; 1,0% v/v). Концентрация на активното вещество в работния разтвор 0,06 % (30 мг активно вещество/m<sup>2</sup>).

**Разходна норма:** 1 л работен разтвор/20m<sup>2</sup>.

| Биоцид мл ниска доза | Биоцид мл висока доза | Водата за разреждане (л) | Обработена повърхност (м <sup>2</sup> ) |
|----------------------|-----------------------|--------------------------|---|
| 25                   | 50                    | 5                        | 100                                     |
| 12,5                 | 25                    | 2,5                      | 50                                      |
| 5                    | 10                    | 1                        | 20                                      |
| 2,5                  | 5                     | 0,5                      | 10                                      |
| 1,25                 | 2,5                   | 0,25                     | 5                                       |

**Честота на обработките за Употреба 1:** 1 – 2 приложения годишно.

**Честота на обработките за Употреба 2:** 4 приложения годишно.

**Достъп на хора и животни до третираните зони е разрешен след изсъхване на повърхностите от нанесения разтвор и добро проветряване.**

**За хлебарки:** Прилага се доза от 30мг активно вещество/m<sup>2</sup> при нормални условия и 15мг активно вещество/m<sup>2</sup> за местообитания с висока хигиена.

Ниската доза се използва при ниска степен на заразяване и високи хигиенни условия.

Високите дози се използват при високо ниво на заразяване и/или ниски хигиенни условия

#### **Остатъчна активност за Употреба № 1:**

Остатъчното действие на продукта варира в зависимост от чистотата и естеството на повърхността, върху която е приложен биоцидът, както и от степента на отлаганията от приложения продукт.

**Срещу мравки** (*Lasius niger*), продуктът показва остатъчна активност до 1 месец, където отлаганията остават ненарушени.

**Срещу дървеници** (*Cimex lectularius*) продуктът показва остатъчна активност до 3 месеца където отлаганията остават ненарушени.

**Срещу германските хлебарки** (*Blattella germanica*), ефективност се постига само с пресни отлагания.

**Срещу комари** (*Culex spp.*) ефективност се постига само с пресни отлагания върху непоръзни повърхности (не и върху поръзни).

**Срещу мухи** (*Musca domestica*) продуктът показва остатъчна активност до 3 месеца.

**Срещу оси** (*Vespa spp.*) се постига остатъчно действие до 3 месеца само на непоръзни повърхности.

#### **Остатъчна активност за Употреба № 2:**

Остатъчното действие на продукта варира в зависимост от чистотата и естеството на повърхността, върху която е приложен биоцидът, както и от степента на отлаганията от приложения продукт.

**Срещу мравки** (*Lasius niger*), продуктът показва остатъчна активност до 1 месец, където

отлаганията остават ненарушени.

**Срещу германските хлебарки** (*Blattella germanica*), ефективност се постига само с пресни отлагания.

**Срещи комари** (*Culex spp.*) ефективност се постига само с пресни отлагания върху

непоръзни повърхности при ниска доза и върху поръзни и непоръзни повърхности - при висока доза.

**Срещу оси** (*Vespa spp.*) се постига остатъчно действие до 3 месеца само на непоръзни повърхности.

## **Инструкции за употреба при Употреба № 1: и Употреба № 2**

**За Употреба № 1:** Да се третират единствено големи сгради.

**За Употреба № 2:** Само за употреба в разрешените помещения за животни.

Преди обработка да се оцени повърхността, която ще се третира (чистота, поръзност и др.). Разтворът се подготвя за пръскане, като се добавя необходимия обем от продукта към необходимия обем чиста вода и се разбърква.

За масовите потребители подходящият обем на продукта се измерва с помощта на дозиращото устройство, предоставено в опаковката на продукта.

За професионални потребители, подходящият обем на продукта се измерва, като се използва контейнерът за дозиране "Bettix" или стандартно дозиращо устройство.

Празната опаковка от биоцида се изплаква трикратно с вода, която се добавя към разтвора за пръскане.

След обработка насекомите, които са влезли в контакт с продукта, показват признания на нок-доун ефект в рамките на 30-60 минути, а забележимо въздействие върху числеността на популацията се очаква в рамките на няколко дни.

Смъртността на хлебарките се постига 1 седмица след излагане на насекомите на третираните повърхности. Видимо повлияване на дървениците се очаква до 24 часа след експозиция на насекомите на третираните повърхности (за Употреба № 1) Смъртността на комарите се постига 48 часа след излагане на насекомите на третираните повърхности.

Забележително повлияване на мухи се очаква в рамките на 6 часа след експозиция на насекомите на непорести третирани повърхности, а смъртността се постига 24-72 часа по-късно (за Употреба № 1)

Забележим нок-даун ефект при оси се очаква в рамките на 6 часа след контакт на насекомите с непоръзни третирани повърхности, като смъртността се постига след 24 часа.

Третираните зони трябва да се проверят отново след 2-3 седмици за наличие на вредители.

Когато първоначалното заразяване е било силно или се наблюдава ново заразяване, може да се наложи втора обработка, особено ако първото третиране не е било щателно или са пропуснати техни убежища/места за проникване при първото приложение.

**Категория на потребителите:** Масова и професионалисти, отговарящи на изискванията на Наредба № 1 от 5 януари 2018 г.

L.

## **Стратегии за управление на резистентност**

Където е възможно, препоръчва се третиранятията да се комбинират с нехимични мерки. За да се избегне възможността за развитие на резистентност на насекоми към продукта, обработките трябва да се редуват с употреба на алтернативни инсектицидни продукти, които имат различен механизъм на действие.

При потвърждение на резистентност независимо да се спре употребата на продукта и да се премине към инсектицид с алтернативен начин на действие. Чрез отстраняване на селекционния натиск резистентните индивиди ще бъдат премахнати с времето и чувствителността на популацията ще се възстанови.

Препоръчаната върху етикета доза трябва да се приложи в рамките на точния времеви интервал, с цел осигуряване на пълен контрол на вредителите. Като се осигури оцеляването на възможно най- малък брой насекоми, разпространението на резистентните насекоми се забавя.

Да се следват добрите практики за биоциди, за да се осигури максимална ефективност на обработката. Недостатъчните приложения при по-ниска от препоръчаната на етикета доза позволява оцелелите насекоми да създадат отново популация, увеличавайки натиска на вредителите срещу продукта, което може да предизвика проблеми с резистентността в бъдеще. Да се установи базова линия и да се наблюдават нивата на ефективност в популации в ключови области, за да се открие всяка значителна промяна в чувствителността към активното вещество. Информацията от програмите за мониторинг на резистентността позволява по-рано откриване на проблеми и дава информация за правилно вземане на решения.

Потребители трябва да информират, ако третирането е неефективно и да докладват директно на притежателя на разрешителното. Притежателят на разрешителното трябва да докладва за всички наблюдавани случаи на резистентност на компетентните органи или на други определени органи, участващи в управлението на резистентността.

## **Приготвяне на работен разтвор**

За приготвяне на работен разтвор, необходимото количество биоцид се прибавя към съответния обем чиста вода и се разбърква добре. Ако има забавяне в процеса между третиранията, е необходимо повторно разбъркване на работния разтвор, преди следваща употреба. количество биоцид се прибавя към съответния

обем чиста вода и се разбърква добре. Ако има забавяне в процеса между третиранията, е необходимо повторно разбъркване на работния разтвор, преди следваща употреба.

#### **Първа помощ и медицински съвети**

Да се отстрани замърсеното облекло.

При вдишване: Почивка, свеж въздух.

При контакт с кожата: Да се отмие обилно с вода и сапун.

При контакт с очите: Обилно да се изплакне с вода в продължение на 15 минути с широко отворени клепачи.

При погълдане: Да се изплакне устата и обилно да се пие вода.

Лечение: При неспазване на предпазните мерки и примане на значителни количества от продукта могат да се появят следните симптоми: локално дразнение на кожата(парене) и дихателните пътища, чувство за глухота и изтръгване на ръцете и краката, белодробен оток, конвулсии. Може да предизвика алергии при контакт с кожата и вдишване. Симптоматично лечение (обеззаразяване, витални функции), не е позната специфична противоотрова.

#### **Мерки в случай на пожар:**

Подходящи средства за гасене на пожар: водна мъглива струя, въглероден диоксид, пяна, суhi гасители.

Специална предпазна екипировка: Да се носи апарат за дихателна защита (противогаз) и защитно облекло за работа с химикали.

Други данни: В случай на пожар и/или експлозия да не се вдишва димът. Застрашените опаковки да се охлаждат с вода. Замърсената вода от гасенето да се събира отделно, да не се допуска попадане в канализацията или отходните води. Остатъци от пожар и замърсената вода от гасенето да се отстранят в съответствие с местните разпоредби.

#### **Предпазни мерки за безопасна работа:**

За професионални потребители: Да се носят защитни ръкавици, устойчиви на химикали при боравене с продукта ((EN 374) - повече за материала на ръкавиците в информационния лист за безопасност). Да се носи защитнооблекло (поне тип 6, EN 13034).

Продуктът не трябва да се прилага в присъствието на животни. Да се избягва продължителен контакт на домашни любимици, особено котки, с третираните повърхности. Да не се използва директно върху или в близост до хrани, фуражи или напитки или върху повърхности или прибори, които могат да бъдат в пряк контакт с хrани, фуражи, напитки и животни.

Да не се нанася върху участъци, подложени на рутинно мокро почистване.

Продуктът трябва да се прилага далеч от животни и да НЕ се прилага директно върху тях. Да се избягва контакт с кожата, очите и дрехите.

#### **Предпазни мерки за опазване на околната среда**

Инсектицидът или остатъци от него, изпразнени резервоари или опаковки да не се изхвърлят във водни басейни. Да не се използва на места, застрашени от измиване и попадане във водни източници. Да не се допуска да попадне в земните пластове. Да не се допуска попадане в канализацията, в повърхностните и подпочвени води.

#### **Мерки при инцидентно разливане**

За малки количества: Да се събират с подходящ абсорбиращ материал (например, пясък, дървени стърготини, универсални свързвщи материали, кизелгур).

За големи количества: локализация/заграждане с дига. Да се изпомпа продуктът.

Събраният материал да се елиминира съобразно разпоредбите. Отпадъците да се събират отделно в подходящи, обозначени и затварящи се съдове. Замърсени предмети и пода да бъдат почистени с вода и повърхностно активни вещества при спазване разпоредбите за опазване на околната среда.

#### **Условия за съхранение**

Да се пази от температури под -10°C и над 40°C. Да се съхранява в заключващи се, проветряеми и суhi помещения, в добре затворени оригинални опаковки с етикети, отделно от хранителни продукти и фуражи. Да се съхранява далече от топлина. Да се пази от влага. Да се пази от директно излагане на слънчевите лъчи.

#### **Унищожаване на опаковки и остатъци от продукта:**

- съдържанието на опаковката да се използва докрай, по предназначение;
- преди да се унищожат според местните изисквания за безопасност, празните опаковки да се направят негодни за употреба чрез смачкване или пробиване;
- празните опаковки да не се използват повторно;
- остатъците от препарата да не се изсипват във водоеми и водоизточници;
- Отпадъците от биоцидния продукт като остатъчни количества и опаковки да се събират в специални плътно затварящи се обозначени съдове, да се съхраняват временно, след което да се предават на лица, притежаващи разрешение по реда на чл. 67 от Закона за управление на отпадъците (обн. ДВ, бр.53/13.07.2012 г.).

Класификация на отпадъците от продукта и опаковките в съответствие с Наредба № 2 от 23.07.2014г., обн., ДВ, бр. 66 от 08.08.2014г.:

Опаковка, код и наименование на отпадъка – 15.01.10\* - опаковки съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества.

**Опаковки: за разделно събиране.**

**Отговорности:** Чрез старателни и прецизни изследвания е доказано, че продуктът е годен за използване при спазване на нашите указания за употреба, съхранение и транспорт. Тъй като приложението, транспорта и съхранението са извън нашето влияние и не можем да предвидим произтичащите от това последствия, ние изключваме всяка наша отговорност при евентуални щети по тези причини. БАСФ носи отговорност за доброто и непроменено качество на продукта съгласно сертификата, но за рисковете при съхранение, транспорт и приложение не отговаря.