

ОПАСНО!

ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

Преди употреба прочетете внимателно етикета

За да се избегнат рисковете за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкцията за употреба!

Внимание



Стомп® Аква Stomp® Aqua

Активни вещества – наименование и съдържание: пендиметалин 455 г/л
пендиметалин (N-(1-етилпропил)-2,6-динитро-3,4-ксилидин).

ГРУПА

3 (K1)

ХЕРБИЦИД

Вид на формулацията: микрокапсулирана суспензия (КС).

Разрешен за пускане на пазара и употреба с Разрешение 01011-5/15.10.2018 г. на основание Заповед № РД 12-54/14.08.2009 г. на Министъра на земеделието и храните, Заповед № РД 11-1982/10.12.2014 г., Заповед № РД 11-703/22.04.2016 г., Заповед № РД 11-1984/09.10.2018 г. и Заповед № РД 11-790/29.03.2024 г. на изпълнителния директор на БАБХ.

Съдържание на опаковката:....

Условия за съхранение: Стомп® Аква се съхранява в заключващи се проветряеми и хладни помещения (при температури над -5 °C и до 40°C), в добре затворени оригинални опаковки с етикети, отделно от фунгициди, инсектициди, фуражи и храни. Да се пази от горещина, влага и директно слънчево греене.

При нормални условия продуктът не променя качествата си най-малко 5 години. По технически причини номерът на партидата и датата на производство са напечатани на друго място.

Указания за опасност: H317 Може да причини алергична кожна реакция. H361d Предполага се, че уврежда плода. EUH401 За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба. EUH204 Съдържа изоцианати. Може да причини алергична реакция.

Указания за безопасност: P201 + P202 Преди употреба се снабдете със специални инструкции и не ползвайте преди да сте прочели и разбрали всички предпазни мерки за безопасност. P261 Да се избягва вдишване на газ/изпарения/аерозоли. P272 Да не се изнася замърсено работно облекло извън работното помещение. P280 Да се носят защитни ръкавици. P302 + P352 При контакт с кожата измийте обилно с вода. P405 Да се съхранява под ключ. P391 Да се събере разлятото. P501 Съдържанието / опаковките да се предадат на събирателен пункт за опасни или специални отпадъци. (SP1) Да не се замърсяват водите с този продукт или с неговата опаковка. Да не се почиства оборудването, с което се прилага продуктът близо до повърхностни води. Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми или пътища. (SPe3) Да се осигури нетретирана буферна зона от 20 м до повърхностни води с цел опазване на водните организми и нетретирана ивица от 5 метра до съседни неземеделски земи, с цел опазване на нецелевите растения.

Притежател за разрешение за пускане на пазара и употреба: БАСФ Агро Б.В., Швейцария

Лице, което пуска продукта на пазара: БАСФ ЕООД, 1618 София, бул. "България" 118,
тел: +359 2 915 20 69; факс: +359 2 915 02 42;

Телефонен номер при спешни случаи: Клиника по токсикология към
МБАЛСМ „Н.И. Пирогов“ +359 2 915 42 33.

International emergency number: +49 180 2273 112

UFI: 66X2-P0SP-P00S-AD7G

Стомп Аква е разрешен за пускане на пазара и употреба в България за борба с едногодишни широколистни и житни плевели при:

Култура	Доза (мл/дка)	Работен разтвор (л/дка)	Момент и начин на приложение	Карантинен срок
Нахут	260	30-60	След сеитба, преди поникване	60
Кориандър за листа	260	30-40	Преди поникване	75



Памук	260	20-60	След сеитба, преди поникване	-
Царевица	260	20-60	1) След сеитба, преди поникване или в началото на вегетация на културите 2) След поникване (до 2-ри лист на плевелите ВВСН 12)	90
Лук (от арпаджик)	260	30-40	След поникване и до 2-ри лист на плевелите	75
Картофи	260	30-40	След сеитба, преди поникване	-
Слънчоглед	260	20-60	След сеитба, преди поникване или преди сеитба с инкорпориране	-
Тютюн	260	30-40	Преди разсаждане на разсада на полето	-
Чесън	250-260	20-60	Рано, веднага след засаждане на културата, преди поява на стъблото над почвената повърхност.	75
Домати	250-260	20-60	Преди разсаждане на културата.	-
Моркови	200-250	20-60	Преди засаждане на културата.	-
Марули, салати	250-260	20-60	Преди поникване на културата или преди разсаждане	-
Артишок	200-250	20-60	Преди разсаждане или на засети насаждения преди начало на вегетацията, на чиста почва преди появата на плевели.	-
Зеле, Карфиол	250-260	20-60	Преди разсаждане на културата.	-
Фасул	250-260	20-60	След сеитба, преди поникване на културата.	-
Грах (полски и градински)	250-260	20-60	След сеитба, преди поникване на културата.	-
Соя	250-260	20-60	След сеитба, преди поникване на културата.	-
Цитрусови култури: портокал, лимон, мандарина, помело, грейпфрут	250-260	20-60	Насочено пръскане между редовете, през пролетта и есента. Преди поникването на плевелите	-
Семкови овощни: ябълки и круши	250-260	20-60	През зимата. преди началото на вегетацията и преди поникването на плевелите.	-
Костилкови овощни: праскови, нектарини и кайсии	250-260	-	През зимата. преди началото на вегетацията и преди поникването на плевелите.	-
Лозя	250-260	20-60	През зимата. преди началото на вегетацията и преди поникването на плевелите.	-
Ягоди	250-260	20-60	Преди засаждане на открито или преди начало на вегетацията през пролетта.	-
Житни култури: пшеница, ечемик, ръж и тритикале	250-260	20-60	След сеитба, преди поникване на културата.	-
Декоративни растения: разсадници, дървета ²⁾	200-260	20-60	Насочено пръскане преди поникване на плевелите между редовете след разсаждане, при добре вкоренени насаждения.	-
Сорго*	260	20-60	Преди или рано след поникване, до ВВСН 16 на културата (шест разтворени листа)	120 дни (Зърно) 90 дни (силаж и зелен фураж)
Ориз*	200-250	20-60	Преди поникване или след поникване ВВСН 12-13	90
Фъстъци*	200-250	20-60	Преди поникване	-

***Минимална култура/употреба съгласно** чл. 51 от Регламент (ЕО) № 1107/2009

Категория за употреба: Втора професионална.

Максимален брой приложения на година: 1

Механизъм на действие:

Активното вещество инхибира деленето и нарастването на клетките основно при меристемните тъкани на корените и стъблата на чувствителните плевели. Активните вещества се поемат предимно от корените и по-слабо чрез листата. Третираните покълващи плевели загиват преди или веднага след поникването им.

Приложение: Стомп® Аква е селективен хербицид за приложение при редица култури. След третиране активното вещество се разтваря и разпределя в повърхностният 2-3 см слой на почвата, образувайки стабилен хербициден екран. Преминавайки през този екран, поникващите плевели влизат в контакт с активното вещество, абсорбират част от него и загиват. За проявление на максималните възможности на продукта е препоръчителна неговата употреба след сеитбата, преди поникването на културата при нормална почвена влажност и добра почвена обработка. Благодарение на специалната си формулация – микрокапсули, Стомп® Аква проявява добри резултати дори и при по-сухи условия на почвата.

Управление на резистентността: С цел предотвратяване развитието на резистентност на плевелите към ПРЗ се препоръчва строго спазване на всички елементи от разрешената употреба на продукта: регистрирани дози, брой приложения за един сезон, време на приложение и др. При многократно използване на вещества с един и същ механизъм на действие (според HRAC), на една и съща площ е възможно плевелите да развият устойчивост към тях, при което ефикасността им се понижава значително. По тази причина, препоръчваме редуване на активни вещества с различен механизъм на действие (различна група по HRAC). Консултирайте се с отговорните институции и търговските представители относно стратегиите за управление на резистентността. Когато е възможно, използвайте устойчиви сортове, биологични продукти /методи за борба. Отговорното управление на резистентността се насърчава с цел ефективен и дългосрочен контрол на вредителите.

Едногодишни широколистни плевели:

Чувствителни плевели:

Бяла куча лобода (*Chenopodium album*), пълзящ щир (*Amaranthus blitoides*), обикновен щир (*Amaranthus retroflexus*), полско огниче (*Anagallis arvensis*), европейска подсунка/знойка (*Heliotropium europaeum*), пача трева обикновена (*Polygonum aviculare*), прасковолисто пиперче (*Polygonum persicaria*), повитицовидно фасулче (*Polygonum convolvulus*), тученица (*Portulaca oleracea*), мак, магарешки бодил (*Silybum marianum*), врабчови червца/звездица (*Stellaria media*), полски синап (*Sinapis arvensis*), черно куче грозде (*Solanum nigrum*), традински кострец (зохос) (*Sonchus oleraceus*), бабини зъби, трабузан (*Tribulus terrestris*), великденче бръшлянолист (*Veronica hederifolia*, *V. persica*), обикновен спореж (*Senecio vulgaris*), колянка (*Spergula arvensis*), лайка (*Maritima spp.*), лубеничник (*Hibiscus trionum*), незабравка (*Myosotis spp.*), орниче малко (*Legousia spp.*), подрумче (*Anthemis arvensis*), теменуга (*Viola tricolor*).

Умерено чувствителни:

Просфорник (*Abutilon theophrasti*), лечебен росопас (*Fumaria officinalis*), лепка (*Galium spp.*), лютиче (*Ranunculus spp.*), дива ряпа (*Raphanus raphanistrum*).

Едногодишни житни плевели:

Чувствителни плевели: Кръвно просо (*Digitaria sanguinalis*), зелена кощрява (*Setaria viridis*), прешленеста кощрява (*Setaria verticillata*), лисича опашка *Alopecurus myosuroides*), ветрушка (*Apera spica-venti*), кокоше просо (*Echinochloa crus-galli*).

Умерено чувствителни: Див овес (*Avena fatua*).

Приготвяне на работния разтвор:

- преди третиране се проверява чистотата и изправността на пръскачката и дюзите;
- определя се разходът на работен разтвор;
- резервоарът на пръскачката се напълва от 1/2 до 3/4 с вода;
- изчисленото количество продукт се излива в резервоара и се разбърква; резервоарът се допълва догоре с вода и се разбърква, докато работният разтвор се хомогенизира напълно;
- започва се пръскането, като се има предвид, че е много важно доброто и равномерно напръскване на добре подготвената почва;
- по време на пръскането работният разтвор трябва да се разбърква постоянно чрез механична бъркалка или връщане на част от разтвора обратно в резервоара;
- след прекъсвания на работата, разтворът трябва отново да се разбърка старателно;

Първа помощ:

Да се отстрани замърсеното облекло.

При вдишване: Почивка, свеж въздух, медицинска помощ.

При контакт с кожата: Да се отмие обилно с вода и сапун.

При контакт с очите: В продължение на 15 минути очите да се изплакнат обилно под течаща вода с широко отворени клепачи.

При поглъщане: Веднага да се изплакне устата и да се изпие 200-300 мл вода, да се потърси лекарска помощ.

Лечение: Симптоматично лечение (обеззаразяване, витални функции), не е позната специфична противоотрова.

Предпазни мерки за опазване на околната среда:

Да не се допуска попадане в канализацията, в повърхностните и подпочвени води. Да не се допуска да попадне в земните пластове.

Мерки за безопасност:

Да се избягва контакт с кожата, очите и дрехите. Неправилната употреба може да доведе до увреждане на здравето. При работа с неразтворен продукт да се носи лицев шлем или маска, стандартно предпазно облекло (за растителна защита), предпазни обувки (например гумени ботуши), предпазни ръкавици (за растителна защита), гумена престилка. Добро проветряване на работното място и складовото помещение. По време на работа да не се яде, пие и пуши. Преди почивка и в края на работния ден да се измиват ръцете и/или лицето. Препоръчва се носенето на затворено работно облекло. Работното облекло да се съхранява отделно, далече от напитки и храни за хора и животни.

Методи и материали за ограничаване и почистване:

За малки количества: Да се събират с подходящ абсорбиращ материал (например, пясък, дървени стърготини, универсални свързващи материали, кизелгур).

За големи количества: локализация/заграждане с дига. Да се изпомпа продуктът.

Събраният материал да се елиминира съобразно разпоредбите. Отпадъците да се събират отделно в подходящи, обозначени и затварящи се съдове. Замърсени предмети и пода да бъдат почистени с вода и повърхностно активни вещества при спазване разпоредбите за опазване на околната среда.

Мерки в случай на пожар:

Подходящи средства за гасене – водна мъглява струя, пена, сухи гасители, въглероден диоксид.

Съвети за пожарникарите: Да се носи апарат за дихателна защита (противогаз) и защитно облекло за работа с химикали.

Замърсената вода от гасенето да се събира отделно, да не се допуска попадане в канализацията или отходните води. Остатъци от пожар и замърсената вода от гасенето да се отстранят в съответствие с местните разпоредби. В случай на пожар и/или експлозия да не се вдишва димът. Застрашените опаковки да се охлаждат с вода.

Унищожаване на опаковки и остатъци от продукта:

- трикратно изплакване на празните опаковки с вода, като водите от изплакването се изливат обратно в резервоара на пръскачката;
- съдържанието на опаковката да се използва докрай, по предназначение;
- преди да се унищожат според изискванията за безопасност, празните опаковки да се направят негодни за употреба чрез смачкване или пробиване;
- празните опаковки да не се използват повторно;
- остатъците от продукта да не се изливат във водоеми и водоизточници.
- Отпадъците от продукта като остатъчни количества и опаковки да се събират в специални плътно затварящи се обозначени съдове, да се съхраняват временно, след което да се предават на лица, притежаващи разрешение по реда на чл.67 от Закона за управление на отпадъците (обн. ДВ, бр.53/ 13.07.2012.).

Класификация на отпадъците от продукта и опаковките в съответствие с Наредба № 2 от 23.07.2014г. за класификация на отпадъците, обн., ДВ, бр. 66 от 08.08.2014г.:

Код и наименование на отпадъка от продукта – 02.01.08* – *агрохимични отпадъци*.

Опаковка, код и наименование на отпадъка – 15.01.10* - *опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества*.

Опаковки: за разделно събиране!

Отговорности: Чрез старателни и прецизни изследвания е доказано, че продуктът е годен за използване при спазване на нашите указания за употреба, съхранение и транспорт. Тъй като приложението, транспорта и съхранението са извън нашето влияние и не можем да предвидим произтичащите от това последствия, ние изключваме всяка наша отговорност при евентуални щети по тези причини. БАСФ носи отговорност за доброто и непроменено качество на продукта съгласно сертификата, но за рисковете при съхранение, транспорт и приложение не отговаря.